

PRESENCE DE LA BLENNIE CAGNOTTE : *BLENNIUS FLUVIATILIS* ASSO 1801 (PISCES, BLENNIDAE) ET DE LA LOCHE : *COBITIS TAENIA* LINNE 1758 (PISCES, COBITIDAE) SUR LE CAUSSE MOYEN-ATLASIQUE

A l'occasion de l'étude de l'ichtyofaune des eaux stagnantes du bassin-versant du Sebou, nous avons rencontré la blennie cagnotte et la loche de rivière.

Pour la blennie, la seule station connue est celle d'Oued Mellah, d'où provient l'individu décrit par PELLEGRIN (1921).

Nous avons rencontré plusieurs individus de cette espèce au lieu dit Zouigha, en aval du plan d'eau à truite, Amghass à 997 m d'altitude et 280 km de l'embouchure du Sebou.

La zone de récolte correspond à un ruisseau méandrique à fond tapissé de cailloux. Les bords sont couverts d'une végétation rivulaire dense. Ce biotope correspond à la description faite par Roule (1925) de l'habitat de cette espèce en France.

Cette espèce adaptée à l'eau douce depuis de très longue date (BERTIN, 1951), vit sur le pourtour de la Méditerranée (BLANC et al, 1971). Elle est issue d'une famille cosmopolite comprenant surtout des petites formes marines vivant sur les côtes de l'hémisphère Nord, du Brésil et dans le sud du Pacifique (PELLEGRIN, 1921).

La loche a été déjà signalée sur le Causse moyen-atlasique à une altitude de 1480m (DAKKI, 1978).

Nous avons rencontré une population importante de cette espèce dans un plan d'eau à truite: le Hachlaf à 1663 m d'altitude.

Ce plan d'eau fait 14 ha pour 5 m de profondeur maximale. Il est alimenté par un tributaire de quelques kilomètres. Le plan d'eau est très riche en végétation aquatique.

Les espèces de poisson qui vivent aussi dans ce milieu sont le barbeau (*Barbus callensis*), autre espèce originale, le rotangle (*Scaardinius erythrophthalmus*) et la truite arc-en-ciel (*Salmo gardneri*), espèces introduites. Il y existe aussi, une écrevisse américaine: *Orconectes limosus*.

BIBLIOGRAPHIE

- BERTIN, L. (1951). - Ichtyogéographie de l'Afrique du Nord. *C.R. Som. Séances Soc. Biog.*, 242 : 79-82.
- BLANC, M.; BANARESCU, P.; GAUDET, J.L. et HUREAU, J.C. (1971). - *European Inland Water fish. A multilingual catalogue*. F.A.O. and Fishing News.
- DAKKI, M. (1978). - Présence de la loche de rivière dans le Causse Moyen-Atlasique (Pisces Cobitidae). *Bull. Inst. Sc. Rabat*, 3 : 185.
- PELLINGRIN, J. (1921). - Les poissons des eaux douces de l'Afrique du Nord. *Mém. Soc. Sc. Nat. Maroc Inst. Sc. Chérifien. Rabat*.
- ROULE, L. (1925). - *Les poissons des eaux douces de la France*. Presses universitaires de France, 228 p.

Mostafa MOUSLIH
Centre National de Recherches en Hydrobiologie
et Pisciculture, B.P. 11, Azrou.